用藥指導單張

衛教小組 DM6880201

學　名：Etanercept

商品名：ENBREL 25MG(健保事審)

中文名：恩博針筒裝注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1.恩博適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物（即DMARDs，例如methotrexate）無適當療效之成人活動性類風濕性關節炎。可以與Methotrexate 併用，以治療對單獨使用Methotrexate 無適當療效反應之病人。

2.亦適用於methotrexate 治療無效或無法耐受的4 至17 歲兒童的活動性多關節幼年型慢性關節炎。恩博尚未對4 歲以下的兒童進行試驗。

3.緩解乾癬關節炎活動期的症狀和病徵，單獨使用Methotrexate 療效不足。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
恩博的治療應在對類風濕性關節炎之診斷及治療有經驗的專科醫師監督下進行。
成人（18-64 歲）類風濕性關節炎成人患者及乾癬性關節炎患者
對於患有類風濕性關節炎的成人病患，恩博的建議使用劑量為25公絲，每週二次，以皮下注射方式給予，間隔時間為72-96 小時。在接受恩博治療的期間，MTX、糖皮質激素類（glucocorticoids)、水楊酸類（salicylates)及非類固醇類抗發炎劑(NSAIDs)，或麻醉劑可繼續使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

如病人有復發或長期感染的病史，或有潛在受到感染的風險。如病人有嚴重敏感或過敏反應出現，必須停止用藥。不可同時使用活痘苗。有血液惡病質病史。如病人曾患有或最近出現有髓中樞神經病，在使用前必須衡量病人所得的益處及風險。充血性心力衰竭。懷孕、授乳、腎衰竭及4歲以下的小童。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DM6880201

學　名：Etanercept

商品名：ENBREL 25MG(健保事審)

中文名：恩博針筒裝注射劑



五、此藥會造成什麼副作用？

Etanercept最常見的副作用為在注射部位產生發紅、腫脹或疼痛的症狀；其他可能的副作用包括頭痛、頭暈、胃部不適或疼痛、腹瀉、皮疹、咳嗽、流鼻水．．．等等。病人如果同時患有增加感染危險性的疾病時，若接受Etanercept治療，有可能會發生嚴重的感染，包括致命的敗血症。

六、此藥儲存時的條件為何？

2° C至8° C冷藏保存。超過有效期限的產品請勿使用。保存在原始包裝內避光，直到使用時為止。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20