用藥指導單張

衛教小組 DL14480101

學　名：Vortioxetine

商品名：BRINTELLIX F.C. 10MG

中文名：敏特思膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

成人鬱症(major depressive disorder)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 未滿65歲成人病人，Brintellix起始及建議投予劑量為10毫克，每日一次。
2. 依個別病人反應，劑量可以增加最高至每日20毫克或減少至最低每日5毫克。
3. 於症狀解除後，建議至少須再持續治療6個月以鞏固抗憂鬱效果。
4. Brintellix為口服使用，單獨服用或與食物併服皆可。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 接受抗憂鬱劑治療期間建議不要飲酒。
2. 因曾有頭暈不良反應的報告，當病人駕駛或操作危險性機械時，還是須小心注意，特別是開始接受vortioxetine治療時，或改變劑量時。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見之不良反應為噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15