用藥指導單張

衛教小組 DA15730101

學　名：Inclisiran Sodium

商品名：LEQVIO INJ. 284MG/1.5ML(自費)

中文名：樂脂益注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

原發性高血脂症(其中之家族性高膽固醇血症僅適用於異合子家族性高膽固醇血症(HeFH))：作為飲食及其他降血脂藥品(例如:最大耐受劑量statin類藥品)的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人之低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量療程

Leqvio 的建議劑量為每一次284 毫克，以單次皮下注射方式給藥：首次給藥後於 3 個月時第二次給藥，隨後每 6 個月給藥一次。

錯過劑量

若距離原定的 Leqvio 給藥時程不到 3 個月，應補給藥並沿用病人原先的用藥時程給予維持劑量。若距離原定的 Leqvio 給藥時程已超過 3 個月，應重新擬定給藥時間表

- 首次給藥後於 3 個月時第二次給藥，隨後每 6 個月給藥一次。

給藥方式

Leqvio 應由醫療專業人員施用。

Leqvio 需以皮下注射方式施打於腹部。應避免注射於有活性皮膚疾病或受傷的部位，例如曬傷、皮疹、發炎或皮膚感染。於給藥前，應目視檢查 Leqvio 是否有顆粒。如果溶液含有顆粒，則不應使用。使用單一預充注射針筒每次給藥284毫克。每支預充注射針筒僅供單次使用。

不相容性

由於目前未有相容性試驗資料，本產品不得與其他藥物混合。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位反應、注射部位疼痛、注射部位紅斑和注射部位皮疹。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02

用藥指導單張

衛教小組 DA15730101

學　名：Inclisiran Sodium

商品名：LEQVIO INJ. 284MG/1.5ML(自費)

中文名：樂脂益注射劑



六、此藥儲存時的條件為何？

室溫下儲存，不可冷凍、避光。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02