


用藥指導單張

衛教小組 DB5050201

學名：Cyproheptadine

商品名：CYPROMIN SOL'N 0.4MG/ML, 120ML

中文名：希普利敏液



一、此藥品的用途是什麼？

皮膚疾患引起之搔癢（濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應）
枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起
之咳嗽、鼻涕。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：治療範圍，一般每天10~15ml，大部分病患用量為每天30~40ml，視病情可加重至每天80ml，建議初使用者每日3次，每次10ml，每天最多不超過0.5mg/kg體重。
7-14歲：每日2~3次，每次10ml，每天最多不超過40ml。2-6歲：每日2~3次，每次5ml，每天最多不超過30ml。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 在服用本品初期，要警告病人不要去從事需要集中注意力和協調性高的工作，此乃由於思睡的副作用會普遍發生，但是，通常在幾天後，就會消失。
2. 警告使用者，其他的抑鬱（如酒精、麻醉性止痛劑、barbiturates），會使本品的CNS抑制作用產生加成性。
3. 支氣管氣喘、青光眼、高血壓、甲狀腺亢進和心臟血管疾病等的患者使用本品宜小心。
4. 只有在療效的益處遠大於冒胎兒受損的危險，才給予孕婦服用本品。
5. 要知道小孩服用本品會造成興奮的狀態（如亢奮、心智混亂，可能發生迷幻作用），要小心觀察刺激作用的早期徵兆。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

昏昏欲睡，口乾，胃痛或噁心，頭痛，體重增加

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張


衛教小組 DB5050201

學名：Cyproheptadine

商品名：CYPROMIN SOL'N 0.4MG/ML, 120ML

中文名：希普利敏液

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師