用藥指導單張

衛教小組 DA12220101

學　名：Losartan

商品名：losart (losartan) 50mg

中文名：暢壓膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓、治療第二型糖尿病腎病變。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

高血壓：

一般起始劑量及維持劑量為每次50mg，每日一次。

治療第二型糖尿病腎病變：一般起始劑量為每次50mg，每日一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

血管內體液缺乏脂患者(如以高劑量利尿劑治療者)，可能發生症狀性低血壓；在服用Losartan前須先矯正此類情況。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

上呼吸道感染、無力、疲倦、頭痛、頭暈、咳嗽。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於室溫 25 度以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03