

用藥指導單張

衛教小組 DN14610201

學名：Diclofenac

商品名：DICLOFENAC INJ. 75MG/3ML

中文名：迪可露芬娜克注射液



一、此藥品的用途是什麼？

無法口服情況下，短期使用於緩解發炎及因發炎引起之疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 為降低不良反應之風險，應使用最低有效劑量，並作為期最短之治療。
2. 通常成人一次 75 mg，一日一次，行外側臀部肌肉深部緩慢注射之，並應時常改換左右臀部注射部位。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 使用消炎鎮痛劑治療，乃為對症療法非原因療法。
2. 使用於治療慢性疾患(慢性風濕性關節炎、僵直性脊髓炎)時應考慮以下事項：
 - (1) 長期投予時，須定期作臨床檢查(尿檢查、血液檢查、肝功能檢查)。遇有異常現象發生時，則須採取減量或停藥等適當措施。
 - (2) 考慮非藥物性療法。
3. 使用於治療急性疾患時，應考慮以下事項：
 - (1) 對於急性炎症須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
 - (2) 原則上應避免長期使用同一類藥品。
 - (3) 如有原因療法則應採用。
4. 須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生。
5. 本藥可能遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投予。
6. 儘量避免與其他消炎、鎮痛劑合併使用。
7. 對小兒及高齡患者，尤其注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投予。
8. Diclofenac 可能導致胎兒動脈導管過早閉合，因此於懷孕後期應避免使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DN14610201

學名：Diclofenac

商品名：DICLOFENAC INJ. 75MG/3ML

中文名：迪可露芬娜克注射液



的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

使用diclofenac治療之病人較為常見的不良反應為胃腸道的影響，包括腹痛、便秘、腹瀉、消化不良、脹氣、大出血/穿孔、心灼熱感、噁心、胃腸道潰瘍(胃/十二指腸)與嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師