

用藥指導單張

衛教小組 DC8610201

學名：Acetylsalicylic acid

商品名：LYACETY POWDER FOR INJ 500MG

中文名：解你疼乾粉注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對不能口服NSAID之成年病人強烈疼痛之短期治療、成人發燒症狀之緩解。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 注射方式可以是深層肌肉注射、直接靜脈注射或靜脈輸注（點滴媒介溶液可以是生理食鹽水、葡萄糖液或山梨醇液）。
2. 不建議本藥與其他藥品混合於同一支針筒內一起注射。
3. 以全身性注射給予藥物，可避免疼痛幅度的波動。兩次給藥應至少間隔4 小時。
4. 劑量—900mg 的DL-lysine acetylsalicylate 相當於500mg acetylsalicylic acid (aspirin)。成人：Aspirin 每次劑量為500mg 或1000mg，每日的最高劑量為 3000mg。老年人：Aspirin 每次劑量為500mg 或1000mg，每日最高劑量為 2000mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有致過敏性休克，或毒性表皮溶解症及史蒂芬強森症候群等嚴重過敏反應之可能，應小心使用並監控其相關副作用。
2. Aspirin 不建議使用於痛風患者。
3. Aspirin 使用於下列情況應小心：
* 有胃潰瘍或十二指腸潰瘍，或消化道出血之病史者，
* 腎衰竭者，
* 氣喘：某些病人之氣喘發作可能與對非類固醇抗發炎藥物或對aspirin 過敏有關。對於此類病患，應禁用本藥。
* 有氣喘過去病史之病人，亦宜小心使用，
* 子宮出血或經血過多（有出血量增加及出血時間延長的危險），
* 使用子宮內避孕器。
4. Aspirin 即使在相當低的劑量，也會有抑制血小板凝集的作用，而且可以持續數天之久。因此，病人如果有任何手術療程，即使是小手術（例如，拔牙），都應該警告其有出血的危險。
5. 風濕病學上建議本藥以高劑量給予，在此情況下，應監測病患是否有藥物過量的任何徵兆。如有耳鳴、聽力受損或暈眩的現象，治療方式則應重新評估。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC8610201

學名：Acetylsalicylic acid

商品名：LYACETY POWDER FOR INJ 500MG

中文名：解你疼乾粉注射劑



此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、胃潰瘍、出血、蕁麻疹、氣喘、有致過敏性休克等嚴重過敏反應、腹部疼痛、注射部位疼痛與局部的反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏25 度以下陰涼乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師