用藥指導單張

衛教小組 DF11300101

學　名：Diclofenac

商品名：TONDONAC GEL 20G(每月限壹支)

中文名：痛就擦凝膠



一、此藥品的用途是什麼？

短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
每日使用3～4次，24小時內切勿超過4次。

三、使用時我該注意的特別事項？

有下列情形者，請勿使用：

1. 懷孕後期的最後三個月，因可能影響胎兒或增加生產過程之風險。
2. 曾因本藥成份引起過敏的人。
3. 曾對其他止痛、發燒或發言藥品有過敏反應者，例如Aspirin、ibuprofen。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

皮膚紅腫或發癢、刺痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02