


用藥指導單張

衛教小組 DL12330101

學名：Alprazolam

商品名：KINAX 0.5MG(管藥四)

中文名：景安寧錠



一、此藥品的用途是什麼？

焦慮狀態。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 通常初劑量 0.25-0.5mg，一日三次，可視病人需要逐漸增加到每日最大量 4mg，分幾次投藥。 2. 老年或體衰之病人，通常初劑量是 0.25mg，一日二～三次，可視需要和耐受性而逐漸增大劑量。 3. 如果初劑量讓病人產生副作用，則應減低劑量。在治療終止或降低日用量時應逐漸遞減，一般建議劑量之遞減每三天應不超過 1mg。 4. 用於兒童：對 18 歲以下兒童之安全性和有效性尚未建立。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Alprazolam 不能用來治療精神病患，也不能替代適當之精神病療法。
2. 凡在從事危險性職業需高度警覺之病人，譬如操作機械或駕車者，勿使用本品治療。
3. 接受本品治療之患者，針對於酒精及其他 CNS 抑制劑應保持謹慎。
4. 本品屬於 Benzodiazepines 之一種，故推測也能透過胎盤，對胎兒造成危險性，並會出現在母乳中；所以妊娠前三個月避免使用此藥，婦女在接受治療前應先考慮這段期間是否有懷孕的可能；醫師也應囑咐病人在治療期間懷孕或準備懷孕，應當先行提出以便停藥。
5. 服用本品一段時間（例如一週至四個月），如突然停藥或迅速減量會有禁斷症狀產生。
6. 併用 opioid 類藥品：Benzodiazepine 類藥品與 opioid 類藥品併用，可能導致重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL12330101

學名：Alprazolam

商品名：KINAX 0.5MG(管藥四)

中文名：景安寧錠



本品副作用常出現在治療時，而通常在續續用藥後，作用即消失。
一般常見的副作用有思睡、頭昏眼花、抑鬱、噁心、眩暈、嘔吐、口乾等現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師