

用藥指導單張

衛教小組 DD16300101

學名：Metoclopramide

商品名：PROMERAN (Metoclopramide) 3.84MG

中文名：胃明朗膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

新生兒、兒童及青少年，單一劑量每公斤體重0.1-0.2毫克 (0.1-0.2mg/kg/dose)，每次間隔6-8小時；單一最高劑量不超過10mg。

通常成人一次1~2錠，一日3次，飯前服用，小孩酌減。

三、使用時我該注意的特別事項？

偶有嗜睡、眩暈，所以，對於正在給予本藥之患者，請其注意開車等伴有危險性的機械操作。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

(1) Syndrome malin：出現運動不能性啞症、強度的肌肉僵硬、吞嚥困難、心搏過速、血壓的變動、發汗等，若接著有發熱時，須中止給藥，並採取冷卻身體，水分補給等的全身性管理。在本症發症時，見有白血球增加及血清CPK上昇的情形很多，另外，曾有過伴有Myoglobin尿之腎機能降低情形，此外，曾有高燒持續，轉變成意識障礙、呼吸困難、循環虛脫、脫水症狀、急性腎衰竭而死亡的病例報告。

(2) 內分泌系：罕有推測因間腦之內分泌機能調節異常 (Gonadotropin分泌及Prolactin分泌異常) 所導致的無月經、持續性地乳汁分泌及男子乳症等症狀，故須嚴密觀察，若認定有異常時，須立即中止給藥。

(3) 錐體外徑症狀：罕有手指震顫、肌肉僵硬、頸和臉部攣縮、眼球回轉、焦躁感等症狀。如出現上述症狀時須中止給藥。嚴重時，須採取給予抗膽素性藥物等適當處置。另外長期給藥時，罕有口周部等的不隨意運動在停藥後仍會持續。

(4) 消化系：偶有胃的緊張性增加，腹痛、腹瀉，便秘等症狀。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD16300101

學名：Metoclopramide

商品名：PROMERAN (Metoclopramide) 3.84MG

中文名：胃明朗膜衣錠



(5) 循環系：罕有血壓下降，心搏過速，心律不整等症狀。

(6) 精神神經系：偶有頭痛、頭重。罕有興奮、不安等症狀。

(7) 其他：偶有倦怠感。罕有發疹、浮腫。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師