用藥指導單張

衛教小組 DM14830101

學　名：Ertapenem

商品名：ERTAPENEM INJ. 1G

中文名：厄他培南注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對Ertapenem具有感受性之細菌引起之感染症。

說明：Ertapenem for Injection適用於治療病人由具感受性之微生物所引起的中度至重度感染，而且適用於下列感染在尚未鑑定出病原菌之前按經驗的治療處理(empiric therapy)：

- 複雜的腹腔內感染
- 複雜的皮膚和皮膚組織感染
- 感染性肺炎(Community Acquired Pneumonia)
- 複雜的尿道感染，包括腎盂腎炎
- 急性骨盆感染，包括產後子宮內肌炎、敗血性流產和手術後婦科感染

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Ertapenem for Injection於13歲以上的病人，一般使用劑量是每天一次，每次1公克。而3個月大至12 歲病童的一般使用劑量為15毫克/公斤一天兩次(最多不超過一天1克)。Ertapenem for Injection可以採取靜脈輸注或肌肉注射。當採取靜脈投與時，輸注Ertapenem for Injection的時間必須超過三十分鐘。對於某些感染如果適用肌肉注射治療時，可以改用肌肉注射Ertapenem for Injection代替靜脈輸注。Ertapenem for Injection一般的治療期間是3至14天，依感染型態和病原菌而有所不同(見適應症)。如果病人的症狀獲得改善，可改用適當的口服抗生素。

在對照臨床試驗中，病人的治療期間從3天至14天。整個治療期間的長短是由主治醫師根據病人感染的部位和嚴重程度及病人的反應來做決定。在某些試驗中，主治醫師在觀察病人症狀獲得改善後，會將治療方式改成口服其他抗生素治療。

三、使用時我該注意的特別事項？

曾有接受β-lactams類抗　素治療的病　發　嚴重且可能致命的過敏性反應(如過敏性休克)及嚴重　膚不良反應，　這些反應較容易發在對多種過敏原有過敏史的病　。曾有報告指出，對penicillin過敏的病　在接受其他β-lactams類抗　素治療後出現嚴重的過敏反應。因此，在開始使　本品前，應該　詢問病　是否對penicillins、cephalosporins、carbapenems、其他β-lactams和其他過敏原有過

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26

用藥指導單張

學　名：Ertapenem

商品名：ERTAPENEM INJ. 1G

中文名：厄他培南注射劑



敏的病史，並審慎評估病　使　本品之風險效益，另考量本品與β-lactams類抗　素間可能潛在交叉過敏反應風險，應特別注意本品的使　。如果有過敏反應發　時，應立即停藥。嚴重的過敏性反應(如過敏性休克)必須採取立即的急救處置。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛，靜脈炎，下痢，噁心，嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

調配溶解前：凍晶乾粉之儲存不可超過 25° C。

注射乾粉經溶解並立即以0.9%氯化鈉注射液稀釋後（　　法　量-使說明），可放在室溫（25° C）於6　時內使　，也可冷藏（5° C）多24　時，　冷藏取出後須於4　時內使　。

Ertapenem for Injection藥品溶液不可冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26