

用藥指導單張

衛教小組 DL3710101

學名：Lorazepam

商品名：LOWEN 0.5MG (管藥四)

中文名：樂穩錠



一、此藥品的用途是什麼？

焦慮狀態。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般病患初劑量每日需1~3mg可分2~3次給予，若是治療失眠則可在就寢前一次給予全日劑量2~4mg。

2歲以上兒童依醫師決定劑量使用。

老年人或身體衰弱的患者，其初劑量建議採取每日1mg或2mg分次服用，但可依照情況的需要及病人的耐受程度予以調整，為避免副作用應慢慢增加劑量，先從晚上開始調量，作為手術前的藥物療法，建議於手術前夜或手術前一、二小時給予2mg至4mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 雖然乳汁所排出的Lorazepam 份量不足以發生藥理作用，但給親自授乳的婦女使用Lorazepam仍應格外留意。
2. 兒童使用Lorazepam 安全性尚未建立，不推薦使用於12 歲以下的兒童。
3. 用於患有急性狹角性青光眼、嚴重呼吸功能不足或重肌無力症的病人時，須格外留意。
4. 對於肝或腎功能不良的患者須採取一般注意事項。
5. 使用benzodiazepine 類藥物，曾出現短暫性健忘，或記憶缺失的報告。
6. 曾經有患者在服用benzodiazepine 類藥物後發生血液惡病質，甚至有肝臟內酵素增加的現象，因此，作為長期治療時，最好定期檢驗患者的肝功能及血球計數。
7. 服用Lorazepam 的患者，除非確定該藥物不致於引起困倦或眩暈，否則不該駕車或操作具有危險性的機械。
8. 在服用Lorazepam 期間，對酒精和其他中樞神經系抑制劑的耐受性將會減低，所以應該避免喝酒或其他中樞神經系抑制劑。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL3710101

學名：Lorazepam

商品名：LOWEN 0.5MG (管藥四)

中文名：樂穩錠



9. Lorazepam 並非用以治療原發性憂鬱症或精神病，治療憂鬱引起的焦慮須注意病患仍有自殺的可能性。

10. 連續使用Lorazepam 作為治療時，應該定期判斷是否有繼續使用的必要。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

不良反應如有發生，則通常是在治療之初，繼續服用或減量之後，即緩解或消失。Benzodiazepine 類藥物最常引起的不良反應為思睡、眩暈、虛弱及情緒不穩。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫儲存，防光、熱，請放置於兒童取用不到的地方。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師