

用藥指導單張

衛教小組 DQ0560301

學名：Gimeracil+Oteracil+Tegafur

商品名：TS-1 ★ 20MG (依診斷事審)

中文名：愛斯萬膠囊20毫克



一、此藥品的用途是什麼？

(1) 胃癌：

(1.1) 癌術後輔助性化療，用於罹患TNM Stage II（排除T1）、IIIA或IIIB胃癌且接受過胃癌根治性手術之成年病人。

(1.2) 適用於治療無法切除之晚期胃癌。

(2) 胰臟癌：適用於治療局部晚期或轉移性胰臟癌病人。

(3) 腸直腸癌：與Irinotecan合併使用於已使用含有Oxaliplatin化學療法失敗之轉移性腸直腸癌病人。

(4) 晚期非小細胞肺癌：適用於對含鉑之化學療法治療失敗的局部晚期或轉移性之非小細胞肺癌。

(5) 膽道癌：與Gemcitabine合併使用治療晚期或復發之膽道癌。

(6) 早期乳癌：併用內分泌療法，適用於具有高復發風險的荷爾蒙受體(HR)陽性和第二型人類上皮生長因子接受體(HER2)陰性早期乳癌之婦女的術後輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

通常為依據體表面積之成人初始劑量(單次劑量)。TS-1 於早、晚餐後一天共兩次給藥，連續給予28天，之後停藥14天，即為一個療程。

大腸直腸癌：TS-1與Irinotecan合併使用

Irinotecan的劑量為125mg/m²，靜脈輸注，每兩週給藥一次。TS-1的劑量根據病人體表面積，每天兩次，連續吃兩週，接著休息兩週，重複以上方式治療。

晚期非小細胞肺癌：TS-1 單獨使用

TS-1 的劑量根據病人體表面積，於早、晚餐後一天共兩次給藥，連續給予28天，接著休息14天。重複以上方式治療，直到疾病惡化或是出現無法耐受之不良事件。

膽道癌：TS-1與Gemcitabine合併使. 治療晚期或復發之膽道癌

Gemcitabine劑量為1000mg/m²，於療程第一天及第八天靜脈點滴輸注，每三週為一個療程。

TS-1的劑量根據病. 體表. 積於早、晚餐後. 天共兩次給藥，連續給予14天，接著休

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DQ0560301

學名：Gimeracil+Oteracil+Tegafur

商品名：TS-1 ★ 20MG (依診斷事審)

中文名：愛斯萬膠囊20毫克



息7天。重複以上. 式治療，直到疾病惡化或是出現無法耐受之不良事件。
具有 復發風險的HR陽性和HER2陰性乳癌之術後輔助化療
TS-1初始劑量依據體表面積決定，於早、晚餐後合併內分泌療法 天共共兩次給藥
，連續給予14天，之後停藥7天，即為 一個療程。

三、使用時我該注意的特別事項？

TS-1對以下患者應審慎給藥：

- (1) 有骨髓抑制之患者。
- (2) 腎功能障礙之患者。
- (3) 肝功能障礙之患者。
- (4) 有感染症之患者。
- (5) 葡萄糖耐受性異常之患者。
- (6) 現行間質性肺炎或有既往病史之患者。
- (7) 現行心臟疾患或有既往病史之患者。
- (8) 消化道潰瘍或出血之患者。
- (9) 老年患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

白血球減少、嗜中性白血球減少、血紅素減少、食慾不振、噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫（25℃）保存，於密閉容器內，置於兒童無法取得之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師