用藥指導單張

衛教小組 DC14520101

學　名：Neostigmine

商品名：NEOSTIGMINE INJ. 0.5MG 1ML

中文名：新斯狄格明注射液



一、此藥品的用途是什麼？

1. 各種腸管麻痺及排尿困難。
2. 由於肌無力、肌肉麻痺、腦溢血、小兒麻痺、神經痛、關節痛等引起之各種運動障礙。
3. 眼肌無力症、綠內障、瞳孔反應檢查。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人通常每日一次，一次1mL注射於肌肉內，依年齡及症狀之輕重由少量而漸次增量至一次3mL或一日數次，一次1mL可反覆使用，腸麻痺者一次1mL亦可每隔4~5小時反覆使用，對於眼科領域一次0.5~1mL注射於皮下內。

三、使用時我該注意的特別事項？

妊娠期/生育期

妊娠期—Neostigmine未在人體或動物作這方面的研究，使用時宜謹慎評估之。

分娩—抗膽鹼製劑，可能會導致尿道刺激及靜脈注射時，可能導致早產。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

Neostigmine比Ambenonium或Pyridostigmine易產生嚴重的蕈毒素(Muscarinic)的副作用。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥應避光儲存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18