

用藥指導單張

衛教小組 DA12050101

學名：Carvedilol

商品名：syntrend 6.25mg(低劑量)

中文名：心全錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓、鬱血性心臟衰竭。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 治療的期間：服用Carvedilol需長期性的治療。不應突然停止治療而應以星期為間隔逐漸減少治療，此對併有冠狀心臟疾病的病人尤其重要。
2. 本態性高血壓：開始治療前兩天的建議劑量為12.5MG，一天一次。之後，建議劑量為25MG，一天一次。必要時，接著以至少兩週之間隔，將劑量增加至每日最大建議劑量50MG，一天一次或分次服用(一天兩次)。
3. 有症狀、穩定、慢性之心臟衰竭：起始治療的建議劑量為3.125MG，一天兩次，為期2週。如果病患可忍受此劑量，可接著將劑量以至少兩週之間隔增加為6.25MG、12.5MG和25MG，一天兩次。劑量應調整到病患能忍受的最大劑量。

有嚴重心臟衰竭的所有病人和有輕度至中度心臟衰竭及體重低於85公斤(187磅)的病人最大建議劑量為25MG，一天兩次。有輕度或中度心臟衰竭及體重高於85公斤的病人最大建議劑量為50MG，一天兩次。

三、使用時我該注意的特別事項？

鬱血性心臟衰竭病患在carvedilol 向上調整劑量時，可能發生心臟衰竭惡化或體液滯留的情形。若產生這些症狀時，應增加利尿劑的劑量而不應再增加carvedilol 的劑量，直到臨床症狀恢復定為止。有支氣管痙攣的慢性阻塞性肺病(COPD)但未服口服或吸入性藥物的患者，應小心使用carvedilol，且僅當治療效益大於危險性時方可使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

暈眩、頭痛，通常是輕微的且尤其於治療的初期。虛弱(包括疲倦)也非常常見。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA12050101

學名：Carvedilol

商品名：syntrend 6.25mg(低劑量)

中文名：心全錠



本品應貯存於 25℃ 下及兒童伸手不及之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師