


用藥指導單張

衛教小組 DI6520201

學名：Ritodrine

商品名：ANPO 50MG (注射)

中文名：安寶注射液



一、此藥品的用途是什麼？

預防早產、流產。惟僅適用於可密切監測心血管不良反應相關症狀與檢驗數值之住院懷孕婦女。

(說明)

- 預防早產(懷孕第16週以後)。
- 婦科手術(即Cervical Cerelage)後早產的預防。
- 分娩時因子宮收縮過度或臍帶受壓迫而引起急性胎兒窘迫(Acute Fetal Distress)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

早產 (PREMATURE LABOR)

靜脈輸注(Intravenous Infusion)

一發現症狀時立即開始靜脈輸注，初劑量0.05mg/min，按其效果每10~15分鐘漸增0.05mg/min，直至達到預期的效果為止。有效劑量通常在0.15mg/min與0.35mg/min之間，當子宮收縮停止後，此輸注必須再持續12~48小時。投與的液體體積應維持最少。最好使用控制性的輸注裝置。使用針筒幫浦，藥品輸注濃度是3mg/mL (150mg Ritodrine Hydrochloride於50mL溶液中)。若不能使用針筒幫浦，藥品濃度須為0.3mg/mL (150mg Ritodrine Hydrochloride於500mL溶液中)。稀釋用的輸注液通常為5%(W/V) Dextrose，因為使用生理食鹽水稀釋液，肺水腫的可能性會增加，生理食鹽水稀釋液適用於Dextrose不適合的病例，如糖尿病患者。

肌肉注射(Intramuscular Injections)

萬一無法靜脈輸注時，需改用10mg肌肉注射。如果仍無法達到預期效果時，在1小時內可再重複一次10mg，而後每2~6小時給與10~20mg，持續12~48小時，視其反應及副作用情形，劑量可予以增減。

預防手術後早產

手術後如有不正常的子宮收縮時，則需參照採用上述之療法。

急性胎兒窘迫(ACUTE FETAL DISTRESS)

這種病症使用Ritodrine的目的是在爭取時間，以便對分娩作最妥善之處理。第一

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DI6520201

學名：Ritodrine

商品名：ANPO 50MG (注射)

中文名：安寶注射液



次靜脈輸注0.05mg/min，在15分鐘內逐漸增加劑量，直到子宮收縮正常為止。有效劑量在0.15mg/min至0.35mg/min之間，輸注期間需密切注意胎兒情況。如果胎兒情況惡化，需立即停藥。又胎兒心跳可能每分鐘增加25次以上，但通常很少見。另外還有很少數嚴重酸中毒(pH<7.15)的情形，於此種情況本藥不宜使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

(尤其是靜脈滴注)改變母體與胎兒的心跳速度及血壓，暫時提昇血糖及胰島素，低血鉀，心悸，噁心，震顫，頭痛，紅斑。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25℃以下，避光處所，並避免冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師