

用藥指導單張

衛教小組 DQ1320101

學名：Chlorambucil

商品名：LEUKERAN★ 2MG

中文名：瘤克寧



一、此藥品的用途是什麼？

慢性淋巴性白血病(首選用藥)、Hodgkin's病、絨毛膜癌、卵巢癌、乳癌、惡性淋巴瘤、濾泡性淋巴瘤。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 開始時：1天0.1~0.2mg/kg，共3~6週(平均病人為1天4~12mg)。
2. 維持量：1天2~6mg，不可超過1天0.1mg/kg，可低至1天0.03mg/kg。
3. 孩童：1天0.1~0.2mg/kg，或1天4.5mg/m²。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

CNS

Confusion; agitation; ataxia; hallucinations; tremors; muscular twitching; flaccid paresis; peripheral neuropathy; seizures; myoclonia.

Dermatologic

Rash; urticaria; skin hypersensitivity (including rare reports of skin rash progressing to erythema multiforme, toxic epidermal necrolysis, and Stevens-Johnson syndrome).

GI

Nausea; vomiting; diarrhea; oral ulceration; mucositis.

Genitourinary

Sterile cystitis; reversible and permanent sterility.

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ1320101

學名：Chlorambucil

商品名：LEUKERAN★ 2MG

中文名：瘤克寧



Hematologic

Bone marrow suppression; leukemia.

Hepatic

Hepatotoxicity; jaundice.

Hypersensitivity

Angioedema.

Respiratory

Interstitial pneumonia; pulmonary fibrosis.

Miscellaneous

Acute myelogenous leukemia; drug fever; secondary malignancies.

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師