

用藥指導單張

衛教小組 DL4610101

學名：Doxepin

商品名：DOXEPIIN 25MG

中文名：杜使平膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

焦慮狀態、憂鬱症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

每天3次，每次25-50mg (每天最高為300mg) 12歲以下孩童不要使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

含酒精之飲料會加強本藥鎮靜之副作用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

其他較少見之副作用為口唇乾燥、口渴、頭痛、眩暈、情緒變化、味覺改變等。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師