用藥指導單張

衛教小組 DL0890101

學　名：Duloxetine

商品名：CYMBALTA 30MG

中文名：千憂解膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

重鬱症、糖尿病週邊神經痛、廣泛性焦慮症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品應一天使用一次，不須考慮進食與否。

三、使用時我該注意的特別事項？

自殺：監測病況惡化或自殺風險。

肝毒性：有肝衰竭，其中有些致死的案例發生於以Cymbalta治療的病患中。當病患產生黃疸或有證據顯示產生臨床上明顯的肝功能障礙，應該停止Cymbalta的治療直到確認造成上述疾病的其他因素才可再度使用Cymbalta。Cymbalta不應用於治療大量使用酒精的病患或慢性肝病病患。

姿勢性低血壓及暈厥：曾有病患服用本藥發生姿勢性低血壓及暈厥的報告。

胃排空速度慢的病患：應小心謹慎地使用本藥治療這些病患。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、口乾、嗜睡、便秘、食慾降低、多汗。

六、此藥儲存時的條件為何？

一般儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09