
用藥指導單張

衛教小組 DA3130101

學　名：Bisoprolol

商品名：BISOPROLOL(concor)1.25MG

中文名：康肯膜衣錠1.25公絲



一、此藥品的用途是什麼？

穩定型慢性中度至重度心衰竭。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
病人必須在過去6週內無急性心衰竭發生，且在過去2週內無改變基本治療，即適當劑量ACE inhibitors（或於ACE inhibitors無法忍受下，使用其他血管擴張劑）和利尿劑、強心配醣體下，再併用bisoprolol。建議治療的醫師應是在治療心衰竭方面有經驗者。使用本品治療心衰竭，應由低劑量開始再逐漸增加劑量達最佳療效。調整依據如下列步驟：

＊1.25mg1天1次，使用1星期，病人適應良好下增加至

＊2.5mg1天1次，再使用1星期，病人適應良好下增加至

＊3.75mg1天1次，再使用1星期，病人適應良好下增加至

＊5mg1天1次，再使用4星期，病人適應良好下增加至

＊7.5mg1天1次，再使用4星期，病人適應良好下增加至

＊10mg1天1次，作持續性治療。

起始劑量由1.25mg開始，病人應該觀察約4小時（尤其注意血壓，心跳速率，傳導障礙，心衰竭惡化症狀），最大建議劑量是10mg1天1次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品應謹慎使用於有下列情況之病患：延遲性PR傳導間隔，心輸量(Cardiac Reserve)不佳，以及末梢循環障礙如Raynaud氏現象。

2. 對患有缺血性心臟疾病患者，不應驟然停用本藥。

3. 因本品為一高度選擇性β-1腎上腺素接受體阻斷劑，對患有阻塞性呼吸道疾病者，本品仍可謹慎使用，不過，對某些氣喘病患仍可能發生呼吸道阻力之增加，此種支氣管痙攣現象，通常可使用常用之支氣管擴張劑如Salbutamol予以消除。

4. 由於本品對β-2接受體之親和性甚低，本品顯無降血糖作用，惟對糖尿病患者仍應謹慎使用；因為可能掩蔽血糖過少之症狀(尤其是心博過速)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13

用藥指導單張

衛教小組 DA3130101

學　名：Bisoprolol

商品名：BISOPROLOL(concor)1.25MG

中文名：康肯膜衣錠1.25公絲



無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

倦怠、眩暈、輕微頭疼、出汗、間歇性跛行或Rayndaud氏疾病之加重及四肢感覺異常、偶見血壓及脈博速率之顯著降低或房室傳導之障礙。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13