

用藥指導單張

衛教小組 DJ12480101

學名：Liraglutide

商品名：SAXENDA INJ 18MG/3ML(自費)

中文名：善纖達注射液



一、此藥品的用途是什麼？

1. 用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數（BMI）為：
 - $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ，或
 - $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ 至 $< 30 \text{ kg/m}^2$ ，且病人至少有一項體重相關共病，例如第二型糖尿病、高血壓或血脂異常。以每天3.0 mg治療12週後，若病人初始體重並未減輕至少5%，應停止善纖達治療。
2. 用於體重控制，做為均衡飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為12歲以上且有下列狀況的青少年病人：
 - 肥胖症（根據國際分界點，身體質量指數（BMI）相當於成人 $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ）並且
 - 體重超過60kg。以每天3.0 mg或最高耐受劑量治療12週後，若病人的BMI或BMI標準分數並未下降至少4%，應停止善纖達治療並重新評估病人狀況。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

投與方式

善纖達僅限皮下注射使用，不得以靜脈注射或肌肉注射方式投與施用。

每日一次，可在一天中任何時間使用，無須隨用餐時間調整。應注射在腹部、大腿或上臂，可改變注射部位和時間點，而不需調整劑量。但決定一天當中最方便的時間後，最好每天固定在大約相同的時間注射。

劑量

成人

起始劑量為每日一次 0.6mg。劑量應按照至少一週的間隔，每次增加 0.6mg 至每日一次 3.0mg，以改善胃腸道耐受性（請見仿單表 2）。若增加至下一個劑量等級後連續兩週耐受不良，應考慮停止治療。不建議超過 3.0mg 的每日劑量。

青少年（ ≥ 12 歲）

12歲以上未滿18歲的青少年，應使用與成人相似的劑量遞增時程（請參閱仿單表2）。劑量應持續增加到 3.0 mg（維持劑量）或最高耐受劑量。不建議超過3.0 mg的每日劑量。

注射筆設計與 NovoFine®或 NovoTwist® 拋棄式針頭，最大長度 8 mm，最細尺寸

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DJ12480101

學名：Liraglutide

商品名：SAXENDA INJ 18MG/3ML(自費)

中文名：善纖達注射液



32G 搭配使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

心臟衰竭的病人

臨床上沒有用於紐約心臟學會 (NYHA) 第 IV 級充血性心臟衰竭病人的經驗，因此不建議將 liraglutide 用於這類病人。

特殊族群

尚未確立下列病人使用 liraglutide 控制體重的安全性和療效：

- (1) 年齡 75 歲以上。
- (2) 與其他體重控制的產品併用。
- (3) 因內分泌疾病或飲食疾病，或接受可能導致體重增加的藥品治療造成的繼發性肥胖。
- (4) 重度腎功能不全。
- (5) 重度肝功能不全。不建議用於上述病人。

善纖達不會影響駕駛或操作機械的能力，或影響極輕微。但在開始使用善纖達的前三個月期間，可能會發生頭暈(dizziness)，若有頭暈症狀則駕駛或操作機械時須謹慎。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、低血糖、注射部位不適。

六、此藥儲存時的條件為何？

初次使用前：請存放於冰箱冷藏 (2° C~8° C)。

初次使用後：請存放於30° C 以下或冰箱冷藏 (2° C~8° C)，超過一個月後則不可使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師