用藥指導單張

衛教小組 DA9720101

學　名：Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Se,Zn,F and I

商品名：ADDAVEN INFUSION 10ML

中文名：微達穩注射液(需給藥)



一、此藥品的用途是什麼？

Addaven是一種澄清，幾乎無色的微量元素溶液。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：針對需滿足基本至適量增加之微量元素需求的成人患者，Addaven的每日建議劑量為10ml（一安瓿）。

給藥方式

不可在未稀釋的情況下給予Addaven。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 肝功能不全患者應小心使用 Addaven。肝功能不全包括：膽汁排出功能受損，可能影響 Addaven 中微量元素排除導致微量元素累積的風險。

2. 腎功能不全的患者應小心使用Addaven，因為經由尿液排除部分微量元素的能力可能顯著的下降。若治療時間超過4 週，必須檢查血漿中微量元素濃度，特別是錳。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、寒顫、發熱、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請保存於30℃以下。

2. 本品經稀釋後，在 25° C 下的使用中物理、化學安定性為 24 小時。基於微生物學的觀點，本產品應立即使用。若未立即使用，使用者應負責使用前的保存時間與狀況，一般在 2-8° C 時不得超過 24 小時，除非於控制良好且經驗證的無菌環境 下進行混合。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.16