


用藥指導單張

衛教小組 DR13800101

學名：Cisatracurium

商品名：CISATRAL ★ 10MG/5ML (專案進口)

中文名：



一、此藥品的用途是什麼？

本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為全身麻醉之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。

【說明】

本產品可作為全身麻醉或加護病房鎮靜時的輔助劑，以鬆弛骨骼肌幫助氣管內插管及機械性人工呼吸的使用。此製劑不含抗菌防腐劑，供單一病患使用。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人快速靜脈注射之使用

氣管內插管：

本產品的成人建議劑量為0.15 mg/kg，在5 到10 秒內快速給予。此劑量在注射120秒後可產生理想的插管狀態。較高劑量可縮短神經肌肉阻斷作用開始的時間。

維持劑量：

給予本產品維持劑量可延長神經肌肉的阻斷作用。在 thiopentone/fentanyl/midazolam 或 propofol 麻醉期間，一個0.03 mg/kg 的劑量在臨床上可有效產生約20分鐘的神經肌肉阻斷作用。持續給予維持劑量並不會造成藥效累進性的延長。

兒童快速靜脈注射之使用(1 個月至12 歲)

氣管內插管：

與成人一樣，本產品的建議起始劑量為0.15mg/kg，注射時間為5-10秒。

維持劑量：

給予本產品維持劑量可延長神經肌肉的阻斷作用。在halothane 麻醉期間，一個0.02mg/kg 的劑量在臨床上可有效產生約9 分鐘的額外神經肌肉阻斷作用。持續給予維持劑量並不會造成藥效累進性的延長。

三、使用時我該注意的特別事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DR13800101

學名：Cisatracurium

商品名：CISATRAL ★ 10MG/5ML (專案進口)

中文名：



本產品可麻痺呼吸肌及其他骨骼肌，但至目前為止對意識或疼痛閥值 (pain threshold) 並無已知的作用或影響。只有在麻醉師或其他熟悉神經肌肉阻斷劑使用的臨床醫師監督或操作下，才可給予本產品，同時應將氣管內插管的設施、肺部機械性人工呼吸器及動脈供氧適當配備都隨時準備妥當。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

心搏過慢、低血壓。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請儲存於冰箱冷藏2-8℃。
2. 避光。
3. 不可冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師