

用藥指導單張

衛教小組 DM16670101

學名：Ampicillin+Sulbactam

商品名：SULAMPI 1.5GM

中文名：舒安比靜脈乾粉注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、吲哚陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬、厭氧性細菌(Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium difficile)、Branhumella catarrhalis引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

使用於成人

Sulbactam sodium/Ampicillin sodium靜脈注射劑常用的劑量，為1.5g到12g的日劑量分成每6或8小時給予一次，每天Sulbactam的最大劑量為4g，較不嚴重的感染可以每12小時注射一次。

可依照疾病的嚴重度和病人的腎功能狀況來增加或減少注射的頻率。治療時間在病人發燒或其他異常症狀治癒後仍需持續給藥48小時，一般正常療程為期5-14天的治療，但是在治療嚴重的病例時，可以延長治療時間或是額外再給予ampicillin。用於預防手術感染時，應在誘導麻醉時應給予1.5~3公克的Sulbactam sodium/Ampicillin sodium靜脈注射劑，以使有足夠的時間在手術期間達到有效的血清和組織濃度，此劑量可以每6-8小時重複給予一次，除非治療需要，否則通常在手術後24小時即可停止用藥。治療無併發性的淋病，可給予1.5g單一劑量的Sulbactam sodium/Ampicillin sodium靜脈注射劑，並應同時口服1.0公克的Probenecid以延長保持Sulbactam及Ampicillin在血漿中的濃度。

三、使用時我該注意的特別事項？

曾有報告指出以Sulbactam sodium/ampicillin sodium靜脈注射劑等青黴素治療可能造成嚴重且偶爾致死的過敏反應。這些反應傾向於發生在有青黴素過敏史或對多種過敏原有過敏反應的病人身上。已有報告指出以頭孢子菌素治療有青黴素過敏病史的病人時，也會出現嚴重過敏反應。給藥前應小心詢問病人對青黴素、頭孢子菌素與其他過敏原是否曾發生過敏反應。若是病人發生過敏反應，應停止用藥並給予適當治療。

當病人出現嚴重的過敏反應應立即以腎上腺素緊急治療，並視情況進行下列處置：給予氧氣、靜脈注射類固醇，以及如氣管插管等呼吸道維持治療。

在接受ampicillin/sulbactam治療的病人中，曾通報嚴重的皮膚反應

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM16670101

學名：Ampicillin+Sulbactam

商品名：SULAMPI 1.5GM

中文名：舒安比靜脈乾粉注射劑



，例如毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)、Stevens-Johnson症候群(SJS)、藥物疹合併嗜伊紅性白血球症及全身症狀(DRESS)、剝落性皮膚炎、多形性紅斑和急性全身性發疹性膿疱症(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)。如果發生嚴重皮膚反應，應停止使用ampicillin/sulbactam，並且應開始進行適當的治療(參閱8副作用/不良反應)。如同使用其他抗生素一般，持續觀察有無包括真菌在內的非感受性微生物生長的跡象是很重要的。假如發生superinfection時，應停止用藥並給予適當治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、注射部位疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師