


# 用藥指導單張

衛教小組 DQ7290101

學名：Etoposide

商品名：FYTOSID ★ FOR IV INJ 100MG/5ML

中文名：癌妥滅靜脈注射液



## 一、此藥品的用途是什麼？

抗癌症。

說明

Fytosid 適用於下列贅瘤之處置：

·頑強睪丸腫瘤Fytosid 靜脈注射液與其他核准化學療劑之組合療法適用於已接受適當手術治療、化學治療及放射治療的頑強睪丸腫瘤患者。

·小細胞肺癌Fytosid 靜脈注射液與其他核准化學療劑之組合療法可作為小細胞肺癌患者之第一線治療。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 報告指出，壓克力（acrylic）或ABS（由丙烯腈、丁二烯及乙烯苯構成的聚合物）材質的塑膠裝置使用未經稀釋的Fytosid靜脈注射液時，會破裂或滲漏。
2. 與其他化學療劑併用於治療睪丸癌時，Fytosid靜脈注射液的一般劑量範圍是50~100mg/m<sup>2</sup>/日於第一天至第五天投予，直到100mg/m<sup>2</sup>/日於第一、三、五天投予。
3. 與其他化學療劑併用於治療小細胞性肺癌時，Fytosid靜脈注射液的一般劑量範圍是35mg/m<sup>2</sup>/日連續四天，直到50mg/m<sup>2</sup>/日連續五天。

靜脈給藥之製備

Fytosid靜脈注射液在輸注之前，必須先以5%葡萄糖注射液或0.9%氯化鈉注射液稀釋，使其最終濃度為0.2%至0.4mg/ml。如果溶液的濃度超過0.4mg/ml，便可能會發生沈澱。曾有快速靜脈注射後發生低血壓的報告，因此建議Fytosid溶液應輸注30至60分鐘。若顧慮輸液的體積，則可延長給藥時間。Fytosid不可以快速靜脈注射給藥。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

曾有快速靜脈注射後發生低血壓的報告，因此建議Fytosid溶液應輸注30至60分鐘。若顧慮輸液的體積，則可延長給藥時間。Fytosid不

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


# 用藥指導單張

衛教小組 DQ7290101

學名：Etoposide

商品名：FYTOSID ★ FOR IV INJ 100MG/5ML

中文名：癌妥滅靜脈注射液



可以快速靜脈注射給藥。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

噁心及嘔吐、低血壓、可逆性禿髮。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

Fytosid靜脈注射液之小瓶應避光並儲存在30° C以下。

本產品放置時間和稀釋濃度有關

使用 NaCl/ D5W 稀釋成

1. 濃度 0.2mg/ml 後，室溫可放置96小時
2. 濃度 0.4mg/ml 後，室溫可放置24小時

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師