

用藥指導單張

衛教小組 DQ10250101

學名：Fentanyl

商品名：PAINKYL ★ FENTANYL 200MCG (管藥二)

中文名：平舒疼口頰溶片200微公克



一、此藥品的用途是什麼？

癌症病患突發性疼痛 (breakthrough pain) 之處置，且適用對象僅限於18歲(含)以上且正在使用類鴉片藥物治療其潛在持續性癌疼痛並具耐受性者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

起始劑量：

1. 劑量之調整應依個別病患的情形而定，使病患獲得充足之止痛效果且可耐受其副作用。病患須先以一片200mcg口頰溶片開始治療。
2. 若使用一片200mcg口頰溶片後仍未達到足夠之疼痛緩解，則以200mcg口頰溶片持續進行劑量調整（即給予第二片 200mcg口頰溶片至總劑量達 400mcg、再給予第三片 200mcg口頰溶片至總劑量達600mcg、或持續給予至第四片 200mcg口頰溶片使總劑量達800mcg）。
3. 各單次劑量之間應相隔至少2小時，每次突發性癌疼痛事件應僅使用一次口頰溶片，即同一次疼痛事件中不應給予多次之口頰溶片。

維持治療：

於維持治療期間，若處方劑量不再足以處置突發性癌疼痛事件連續數次後，請依前述之劑量調整方法調升劑量。一旦完成劑量調整，往後每次事件都將以含其調整劑量的口頰溶片單次劑量治療。PAINKYL之使用應限制在一天四劑以下；若病患每日經歷超過四次突發性癌疼痛事件，則可考慮提高治療持續性癌疼痛的日夜連續型 (around-the-clock) 鴉片類藥物劑量。

PAINKYL 用法

1. 首先用舌頭潤濕口腔兩頰內壁或用清水漱口，潤濕欲貼上口頰溶片處。請於使用口頰溶片前一刻才拆開包裝，然後將整片口頰溶片置於一乾燥手指近指尖處（粉紅面朝上）並保持固定。將口頰溶片之粉紅面貼附於口腔臉頰內壁，按壓並維持口頰溶片於固定位置上5秒，使口頰溶片固定黏貼上。五分鐘後病患即可飲用液體。
2. 使用 PAINKYL口頰溶片前不可將其切割或撕裂。
3. 敷上後，PAINKYL口頰溶片將於15至30分鐘內溶散。口頰溶片不應以舌頭或手指觸弄，且於口頰溶片溶散前應避免進食。

三、使用時我該注意的特別事項？

類鴉片止痛劑可能影響用藥者執行有潛在危險作業（如駕駛車輛或操

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DQ10250101

學名：Fentanyl

商品名：PAINKYL ★ FENTANYL 200MCG (管藥二)

中文名：平舒疼口頰溶片200微公克



作機械)之精神及 / 或生理能力；應向使用PAINKYL的病患警告該等危險之存在，並據此給予建議。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭暈、噁心、嘔吐、嗜睡、便秘、多汗、虛弱等。

六、此藥儲存時的條件為何？

請保存於20°-25° C，於預備使用時可允許之溫度變動範圍為15°-30° C。

請避免 PAINKYL 受凍或受潮；若鋁箔包事先已開封，請勿使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師