用藥指導單張

衛教小組 DM9660101

學　名：Calcium chloride+Potassium chloride+Sodium chlori



商品名：RINGER'S INJ. 500ML(非藥局發)

中文名：林克氏注射液

一、此藥品的用途是什麼？

大手術時出血、外傷之水份及電解質的補給。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常成人1回500~1000mL，由皮下或靜脈緩慢地點滴注射，依症狀適宜增減。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、取用時：

1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或膠塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2.本品為無色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法：

1.請依輸液套使用方法正確使用。

2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免 因針割(Coring)產生碎片。

3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃以下貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19