用藥指導單張

衛教小組 DS16180101

學　名：Tacrolimus

商品名：PROGRAF 5MG(高劑量)

中文名：普樂可復膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

肝、腎移植之第一線用藥或肝、腎移植CYCLOSPORINE無效之第二線用藥，心臟移植之第二線用藥，心臟移植之第一線用藥。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

腎臟移植

通常移植前2天，口服 tacrolimus一天兩次，一次0.15mg/kg。手術後初期，口服 tacrolimus 一天兩次，一次0.15mg/kg。然後逐漸減量至維持劑量一次 0.06mg/kg，一天兩次為標準，但可依病患症狀適當地調整。

肝臟移植通常初期口服 tacrolimus一天兩次，一次0.15mg/kg。然後逐漸減量至維持劑量 0.10mg/kg/天為標準，但可依病患症狀適當地調整。

心臟移植

通常初期口服 tacrolimus一天兩次，一次0.03~0.15mg/kg。若是排斥反應出現後才開始給予本藥時，通常口服 tacrolimus一天兩次，一次0.075~0.15mg/kg。劑量依病患症狀可適當地調整，如果病患狀況穩定後，可慢慢減量維持在有效的最低劑量。因為在持續高血中濃度時，可能發生腎功能不全，所以在投予大約12小時後儘可能地將血中濃度維持在20ng/mL或以下。

三、使用時我該注意的特別事項？

慎重給藥(對以下之患者應慎重給藥)

1. 肝功能不全患者。
2. 有腎功能不全的患者。
3. 高齡者。
4. 有感染症的患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

震顫、頭痛、腹瀉、噁心、血糖過高、糖尿病、高鉀血症、高血壓、

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DS16180101

學　名：Tacrolimus

商品名：PROGRAF 5MG(高劑量)

中文名：普樂可復膠囊



失眠。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫15~ 30℃保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20