# 用藥指導單張

衛教小組 DD11500101

學　名：Vedolizumab

商品名：ENTYVIO INJ 300MG(需事審)

中文名：安潰悠凍晶注射劑




## 一、此藥品的用途是什麼？

適用於治療以下的成人病人：

(1) 中度至重度活性潰瘍性結腸炎。

(2) 中度至重度活性克隆氏症。 對腫瘤壞死因子 (TNF) 阻斷劑或免疫調節藥物治療反應不佳、失去治療反應或無法耐受；或對皮質類固醇治療反應不佳、無法耐受或證實發生依賴性。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

用於潰瘍性結腸炎或克隆氏症成年患者的劑量

安潰悠用於潰瘍性結腸炎或克隆氏症成年患者的建議劑量為300 毫克，使用方式為第0 週、第2 週和第6 週時以靜脈輸注方式給藥，之後每隔8 週給藥一次。第14 週未出現治療效益證據的患者應停止治療。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 掀開並取下單劑藥瓶的蓋子，使用酒精棉片擦拭。使用21 至25 gauge 規格針頭，以4.8 毫升注射用無菌水配製安潰悠藥瓶中的凍晶粉末。

2. 將注射器針頭插入藥瓶橡膠塞中央，並導引注射用無菌水沿藥瓶玻璃壁流下，以免產生大量泡沫。

3. 輕輕晃動藥瓶至少15 秒，以溶解凍晶粉末。切勿用力搖晃或倒轉。

4. 請勿將其他藥品加入準備好的輸注溶液或靜脈輸注管線組。輸注溶液配製完成並稀釋後，請盡快使用。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

## 五、此藥會造成什麼副作用？

鼻咽炎、頭痛、關節痛、噁心、發熱、上呼吸道感染、倦怠、過敏反應。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

# 用藥指導單張

衛教小組 DD11500101

學　名：Vedolizumab

商品名：ENTYVIO INJ 300MG(需事審)

中文名：安潰悠凍晶注射劑




未開啟之藥瓶應冷藏於2° 至8° C。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20