用藥指導單張

衛教小組 DM3260201

學　名：Varenicline

商品名：CHAMPIX 戒菸 1MG(高劑量)

中文名：戒必適膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

戒菸輔助劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
病人應預設一個停止吸菸的日期，並在這個日期之前一週開始投藥。病人另可以選擇開始服用CHAMPIX，然後在療程的第8天到第35天之間任選停止吸菸日期。
CHAMPIX應在飯後口服，並以一整杯水配服。

成人：第1到3天，0.5mg 每日一次在
第4到7天， 0.5mg 每日兩次
從第8天-治療結束 每日兩次 1mg

病人應使用CHAMPIX治療12週。

三、使用時我該注意的特別事項？

目前已有使用CHAMPIX病人有關交通意外、差點造成交通事故(near-miss)或其他意外傷害的上市後通報案例。在某些案例中，病人通報有嗜睡、暈眩、失去意識或注意力難以集中而造成事故，或顧慮駕駛或操作機械時可能的傷害。應建議病人在未知CHAMPIX對自身的可能影響時，於駕駛或操作機械或參與其他具潛在危險性活動時宜小心謹慎。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、異夢(逼真、不尋常或怪異的夢境)、便秘、脹氣和嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 25° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18