用藥指導單張

衛教小組 DM16790101

學　名：Sodium nitrite+Thiosulfate

商品名：NITHIODOTE(政府補助)

中文名：氰化物解毒劑



一、此藥品的用途是什麼？

治療氰化物(Cyanide)中毒

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

sodium nitrite及sodium thiosulfate的靜脈輸注劑量

1.成人:

(1)sodium nitrite-sodium nitrite 10ml以速率2.5~5ml/minute靜脈輸注

(2)sodium thiosulfate-sodium thiosulfate 50ml在sodium nitrite 10ml投與完畢後立刻給與

2.小兒:

(1)sodium nitrite-sodium nitrite以0.2ml/kg(6mg/kg or 6-8ml/m2 BSA)的劑量，2.5~5ml/minute的輸注速率給與，總劑量不超過10ml

(2)sodium thiosulfate-以劑量1ml/kg(250mg/kg or approximately 30-40ml/m2 of BSA)在sodium nitrite 10ml投與完畢後立刻給與，總劑量不超過50ml

3.再給藥：如果氰化物中毒的症狀再出現，則再次給與原劑量減半的sodium nitrite 及 sodium thiosulfate。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

1.sodium nitrite:

暈厥，低血壓，心搏過速，心悸，心律不整，變性血紅素血症，頭痛，暈眩，視力模糊，癲癇，意識不清，昏迷

2.sodium thiosulfate:

低血壓，頭痛，定向力失調

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DM16790101

學　名：Sodium nitrite+Thiosulfate

商品名：NITHIODOTE(政府補助)

中文名：氰化物解毒劑



六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於室溫20~25℃；短時間允許於15~30℃。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15