


用藥指導單張

衛教小組 DA0450101

學名：Sodium valproate

商品名：depakine 腸溶錠 200mg(低劑量)

中文名：帝拔癲腸溶錠



一、此藥品的用途是什麼？

泛發性與局部性癲癇症、兒童抽搐或兒童熱性抽搐、行為失常並伴有癲癇症者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量

本藥不適用於六歲以下的孩童(考慮吞食錠劑可能引起窒息的危險)。每24 小時平均劑量如下：

- 孩童：30 mg/kg(建議使用糖漿或口服液之劑型給藥)。
- 青少年及成人：20~30 mg/kg(建議使用錠劑或持續性藥效錠之劑型給藥)。

用法

口服使用。每日劑量分二到三次服用，建議與餐點同時服用。開始使用sodium valproate 治療

- 若病人已服用其他抗癲癇藥物治療時，應以漸進方式逐漸加入sodium valproate，在二星期內增加至最適當的劑量，若有需要，原先的抗癲癇藥物可在病情控制下慢慢減量。

- 沒有服用其它抗癲癇藥物的病人，每隔 2 到3 天逐次增加sodium valproate 的劑量，約在一星期內可達到最適當的治療劑量。

- 如果須要加入其他的抗癲癇藥物，應以漸進方式逐漸加入。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 在接受Depakine 治療前應先做肝功能測試，並在治療期的最初六個月內做定期監測，特別是高危險群的病人。

2. 三歲以下的孩童若接受valproate sodium 治療，在治療前應先評估治療效益和可能引起病人發生肝病的危險

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 有些患者在治療剛開始時會出現腸胃道不適（噁心、嘔吐、胃痛

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DA0450101

學名：Sodium valproate

商品名：depakine 腸溶錠 200mg (低劑量)

中文名：帝拔癲腸溶錠



、腹瀉），這些症狀通常在幾天之後就會消失，不需要停藥。 2. 曾有暫時性及/或與劑量相關之不良反應的報告：輕微的姿勢性顫抖及昏睡感。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥應貯存在室溫下 (低於25℃) 乾燥處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師