

用藥指導單張

衛教小組 DE15610101

學名：Potassium chloride

商品名：potassium chloride ★ 10meq/5ml (小包裝) (氯化鉀)

中文名：氯化鉀注射液15%



一、此藥品的用途是什麼？

治療鉀缺乏症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

若本藥濃度在每 ml 含 1.5 mEq 和 2mEq 之K⁺時，靜脈投與前必須稀釋，若直接注射，病患可能會立即死亡。可與靜脈輸注液如 5% Dextrose Injection、5% Dextrose - 0.9% Saline Injection 及 0.9% Sodium Chloride Injection 稀釋後使用。

1. 成人

靜脈輸注的劑量和速率視每個病患個人需求而定，每日可以使用到 400 mEq 的 K⁺（通常不超過 3 mEq/kg）。先輸注投與 40~60 mEq 後，再依測得的病患的血鉀濃度和心電圖，來決定後續輸注所需的速率。當血鉀濃度大於 2.5mEq/L 時：每日可以使用到 200 mEq 的 K⁺，以濃度小於30 mEq/L，且每小時不超過 10 mEq 的速率靜脈輸注。當血鉀濃度小於 2 mEq/L 時，且心電圖改變或麻痺時（緊急治療）：可以使用到每日 400 mEq 的 K⁺以適當濃度，而通常每小時不超過20 mEq 的速率靜脈輸注。

2. 孩童

每日可以使用到 3 mEq/kg 或 40 mEq/m² 的 K⁺。投與的輸注液體積依身體大小調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

本藥不可直接作靜脈注射必須稀釋後方可使用。

1. 不可使用於尿少症患者。
2. 嚴重腎臟疾病、Addison 氏病、急性脫水中暑性痙攣、高血鉀症，不可使用本藥。
3. KCl 注射之正確用量必須依病人血鉀之濃度，心電圖之結果而定。使用鉀鹽製劑，應格外小心，以免引起中毒現象。故需特別注意隨時監測，若鉀離子過高則需中止使用。
4. 授乳期應小心使用。
5. 代謝性酸中毒併有鉀低血症時，應使用鹼性鉀鹽（如 Potassium bicarbonate, citrate, gluconate, acetate）
6. 有心臟疾病時要謹慎使用，尤其是併用 Digitalis 或同時有腎衰

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE15610101

學名：Potassium chloride

商品名：potassium chloride ★ 10meq/5ml (小包裝) (氯化鉀)

中文名：氯化鉀注射液15%



竭、代謝性酸中毒、Addison's 等疾病的病人。此外，長期或嚴重腹瀉、腎上腺功能不全、家族性週期性麻痺、低血鈉症、先天性肌強直症也要小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

高血鉀症：症狀包括四肢感覺異常、鬆弛性麻痺、反射消失、無力感、無精打采、精神紊亂、腿無力、低血壓、心律不整、心跳停止與心電圖異常。

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃ 以下避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師