

用藥指導單張

衛教小組 DI15770101

學名：Carbetocin

商品名：DURATOCIN ★ INJ 100MCG/1ML(自費)

中文名：巧特欣注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

預防子宮收縮乏力造成的產後出血。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

用量

硬膜外或脊髓麻醉下剖腹產時

抽出 1 毫升內含 100 微克 carbetocin 的DURATOCIN，只能靜脈注射，並需在醫院內有適當醫療監督下施打。

陰道生產時

抽出 1 毫升內含 100 微克 carbetocin 的DURATOCIN，在醫院內有適當醫療監督下靜脈注射或肌肉注射。

用法

Carbetocin僅能在嬰兒出生後施打。生產後要儘快施打，最好能在移除胎盤前。靜脈注射carbetocin應以不低於1分鐘的速度緩慢施打。DURATOCIN只能施打一劑，不應再施打更多劑的carbetocin。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 只有在設備良好的產科專科醫院，而且隨時都有經驗豐富且合格的專業人員情況下，才能施打carbetocin。
2. 在嬰兒出生前任何一產程都不適宜使用 carbetocin，因其子宮收縮作用會持續數小時。這和 oxytocin 停止輸注後，藥物作用會快速降低的現象成明顯對比。
3. 如果施打 carbetocin 後陰道或子宮還是持續出血，必須要找出出血的原因。要考慮的原因有：胎盤組織殘留、會陰、陰道及子宮頸撕裂、子宮修復不完全或凝血異常等。
4. Carbetocin 僅供單次靜脈或肌肉注射使用。靜脈注射使用必須緩慢施打不低於 1 分鐘。如果子宮持續張力不足或收縮乏力，造成大量出血，應考慮使用其他子宮收縮劑治療。對於使用額外劑量的 carbetocin 或施打 oxytocin 後子宮持續收縮乏力時，再施打 carbetocin 的情況，目前並沒有研究資料。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DI15770101

學名：Carbetocin

商品名：DURATOCIN ★ INJ 100MCG/1ML(自費)

中文名：巧特欣注射劑



請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、低血壓、潮紅、噁心、嘔吐、腹痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

存放在30℃以下，避免冷凍。本藥劑不能和其他藥劑混合。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師