


用藥指導單張

衛教小組 DQ2080101

學名：Tegafur 100mg, Uracil 224mg

商品名：UFUR★ 100MG

中文名：友復膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

胃癌、大腸癌、乳癌、結腸癌、頭頸部鱗狀上皮癌、與cisplatin併用治療轉移及末期肺癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

口服使用，每日劑量以tegafur計算為500-800 mg/day（或300-350 mg/m²/day），分2~3次服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 下列情況的患者應謹慎服藥，包括骨髓抑制、肝或腎弁鉦好、感染性疾病、心臟疾病、胃腸潰瘍或出血、血糖耐受性異常及罹患水痘等。
2. 本藥可能引起嚴重的副作用，如骨髓抑制、肝臟損害(如猛爆性肝炎)等，應定期嚴密地監測血液、肝臟及腎臟的功能剛使用的前二個月，每月至少檢測一次，若有任何異常，應採取適當的處置(如停藥或減低劑量)。
3. 若發生嚴重的腸炎並造成脫水，應給予適當處置，如補充液體等。
4. 應小心避免發生或加重感染或出血之情形。
5. 懷孕或授乳的婦女應避免使用本藥。
6. 兒童使用本藥的安全性尚未建立，若須使用應特別小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

本藥最常見的副作用為： 1. 消化系統症狀：厭食(3.8%)、噁心(2.4%)、嘔吐(1.1%)及腹瀉(1.5%)。 2. 惡血質：白血球減少症

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ2080101

學名：Tegafur 100mg, Uracil 224mg

商品名：UFUR★ 100MG

中文名：友復膠囊



(3.1%)、血小板減少症(1.1%)及貧血(0.8%)。 3. 肝臟異常(1.8%)。
4. 色素沈著(0.7%)。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師