用藥指導單張

衛教小組 DD10240101

學　名：Omeprazole

商品名：OMEZOL (Omeprazole) 20MG(不可磨粉)

中文名：瘍寧膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger - Ellison症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌相關的消化性潰瘍。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

胃潰瘍：建議劑量為Omezol 20mg，每天一次。症狀可迅速緩解，且大多數患者會在4週內痊癒。

十二指腸潰瘍：對患有活動性十二指腸潰瘍之病人建議劑量為Omezol 20mg， 每天一次。

逆流性食道炎：建議劑量為Omezol 20mg，每天一次，症狀可迅速緩解，且大多數患者會在4週內痊癒。

Zollinger-Ellison症候群：治療Zollinger-Ellison症候群之劑量需依個人來調整，且只要臨床上需要，就持續治療下去。建議劑量為每天Omezol 60mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用, 切勿擅自增減藥量或停藥, 並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛，胃腸道的影響。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯存於低於30℃處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.16