用藥指導單張

衛教小組 DH5320101

學　名：Policresulen

商品名：ALBOTHYL V.T

中文名：安可治陰道栓劑



一、此藥品的用途是什麼？

子宮頸糜爛、白帶、陰道炎、子宮頸炎（含由毛滴蟲及念珠菌引起者）。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 子宮頸糜爛：使用濃縮液每週1-2次，先將患部清洗拭乾，用沾有原液紗布塞子輕按患部1-3分鐘即可。
2. 子宮頸帶下、子宮頸炎：以止血鉗夾浸吸本品之棉花球，灼療子宮頸道，每次1-2分鐘，每週1-2次。
3. 白帶：使用栓劑，每天或隔天1片，連用4次，俟月經後再用2次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Albothyl會在治療過程中產生刺激作用。如果壞死組織由病兆區脫落，即使是大量時，無需驚恐。
2. 在治療期時不可用刺激性肥皂清洗或性交。
3. 與其他陰道製劑一樣，Albothyl在月經來時不可使用。
4. 應避免眼部接觸Albothyl。
5. 如有棉織物及皮革與Albothyl接觸後，必須在製劑未乾潛力及洗乾淨。
6. 陰道栓劑上的斑點，是由栓劑基劑產生的自然現象，不影響其使用，效果或耐受性。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

在以Albothyl會在治療過程中產生刺激作用，但通常迅速地消退。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.12

用藥指導單張

衛教小組 DH5320101

學　名：Policresulen

商品名：ALBOTHYL V.T

中文名：安可治陰道栓劑



藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.12