

用藥指導單張

衛教小組 DQ8310201

學名：Goserelin

商品名：zoladex ★3.6mg(低劑量)(依診斷事審)

中文名：諾雷德持續性注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

嚴重攝護腺癌之輔助治療，停經前或更年期婦女之乳癌治療，子宮內膜異位之治療、手術前薄化子宮內膜及縮小子宮肌瘤、人工協助生殖。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 皮下注射3.6mg長效針，每28天一次，注射時要局部麻醉，老年人從前腹部壁內，和腎衰竭或肝衰竭病人，劑量不必調整。
2. 子宮內膜異位，必須連續治療6個月。

三、使用時我該注意的特別事項？

不能用於兒童。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

停經症狀(熱潮紅、陰道乾燥)、陽萎、性慾減低、男性女乳、頭痛、噁心、骨質流失。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師