用藥指導單張

衛教小組 DA4540301

學　名：Diltiazem

商品名：herbesser（口服）30mg

中文名：合必爽錠



一、此藥品的用途是什麼？

狹心症、輕度至中度之本態性高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.狹心症:

通常成人1次30mg Diltiazem HCl，1日服用3次。症狀較重時，可增量至1次60mg，1日服用3次。

2.輕度至中度之本態性高血壓:

通常成人1次30~60mg Diltiazem HCl，1日服用3次。

又，依年齡、症狀適宜增減用量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.鈣離子拮抗劑突然中止使用時，有症狀惡化之報告，故欲停用本劑時應漸漸減少劑量，並仔細觀察。

2.本藥並不能阻止急性狹心症發作。

3.注意不要讓患者在沒有醫師指導下停藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

水腫、頭痛、噁心、眩暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥應儲存於冷暗乾燥處，避免光熱照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20