

用藥指導單張

衛教小組 DB13660101

學名：Acetylcysteine

商品名：actein granules 40mg/gm (2.5gm/pack)

中文名：愛克痰顆粒40毫克/公克



一、此藥品的用途是什麼？

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及12歲以上：每次5公克，一天3次。

6歲以上未滿12歲：適成劑量之1/2。(每次2.5公克)

3歲以上未滿6歲：適成劑量之1/4。(每次1.25公克)

3歲以下：請洽醫師診治。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(1) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(2) 3歲以下。

(3) 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

其他使用上注意事項

(1) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 不得與含酒精飲料併用。

(5) 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB13660101

學名：Acetylcysteine

商品名：actein granules 40mg/gm (2.5gm/pack)

中文名：愛克痰顆粒40毫克/公克



五、此藥會造成什麼副作用？

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。
- (3) 消化道：有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。
- (4) 皮膚：有發疹等過敏症狀。
- (5) 其他：有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症發生。

六、此藥儲存時的條件為何？

本品極易吸濕，請貯存於25℃以下乾燥處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師