用藥指導單張

衛教小組 DM10440201

學　名：Tranexamic acid

商品名：TRANSAMIN 口服藥 250MG

中文名：斷血炎膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

全身及局部出血或出血性疾病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
Tranexamic acid通常成人1日750　2000mg分3　4次經口投與。依照年齡、症狀之輕重適當增減用量。

三、使用時我該注意的特別事項？

謹慎給藥（對下列患者應謹慎給藥）

1. 有血栓的患者(腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎等)及可能出現血栓症的患者(有血栓安定之虞)
2. 消耗性凝固障礙的患者(應與Heparin等併用)（有血栓安定之虞)
3. 手術後臥床狀態下的患者及接受壓迫止血措施的患者(因為處於容易產生靜脈血栓的狀態，施予本產品有血栓安定之虞。報告顯示曾出現因下床、壓迫解除，而導致肺栓塞症發作的病例。)
4. 對本劑曾有過敏的患者。
5. 腎衰竭的患者（可能會導致血中濃度上昇）。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、食慾不振、胸痛、搔癢感、發疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25°C以下

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21