用藥指導單張

衛教小組 DM16500101

學　名：Bimekizumab

商品名：BIMZELX INJ 160MG/1ML(依診斷事審)

中文名：本能適注射液



一、此藥品的用途是什麼？

斑塊性乾癬

治療適合接受全身性療法或光療法的中度至重度斑塊性乾癬成人病人。

乾癬性關節炎

適用於治療活動性乾癬性關節炎成人病人。

無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎(Non-radiographic axial spondyloarthritis, 簡稱nr-axSpA)

適用於治療活動性無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎且符合下列所有條件之成人病人：（1）對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)治療反應不佳或無法耐受。（2）其C反應蛋白(C-reactive protein, 簡稱CRP)濃度升高。（3）核磁共振造影(MRI)檢查證據顯示有發炎的客觀跡象。（4）HLA-B27 陽性。

僵直性脊椎炎(Ankylosing spondylitis, 簡稱AS)

適用於治療對傳統療法反應不佳或耐受性不良的活動性僵直性脊椎炎成人病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
Bimzelx以皮下注射方式給藥。

斑塊性乾癬

Bimzelx對斑塊性乾癬成人病人的建議劑量為320 mg,在第0、4、8、12、16週和之後每8週（以2劑皮下注射160 mg劑量投藥)。

乾癬性關節炎

Bimzelx對活動性乾癬性關節炎成人病人的建議劑量為160 mg, 每4週以皮下注射方式投予 。對同時罹患中至重度的斑塊性乾癬的乾癬性關節炎病人，建議劑量與斑塊性乾癬相同。

無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎(nr-axSpA)與僵直性脊椎炎(AS) Bimzelx對無

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DM16500101

學　名：Bimekizumab

商品名：BIMZELX INJ 160MG/1ML(依診斷事審)

中文名：本能適注射液



放射影像確認之中軸性脊椎關節炎與僵直性脊椎炎成人病人的建議劑量為160 mg，每4週以皮下注射方式投予。

三、使用時我該注意的特別事項？

感染

Bimzelx可能會增加感染的風險，例如上呼吸道感染與口腔念珠菌感染。當考慮對患有慢性感染或反覆感染病史的病人使用Bimzelx時應謹慎考慮其風險和效益。對於有臨床上重要之活動性感染的病人，在感染緩解或接受適當治療之前，不可開始使用Bimzelx治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

上呼吸道感染(最常見為鼻咽炎)與口腔念珠菌感染。

六、此藥儲存時的條件為何？

置於冰箱冷藏 (2° C - 8° C)。

可存放於室溫下(至25℃)至多30天。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20