用藥指導單張

衛教小組 DA9740101

學　名：Propafenone

商品名：RHYNORM 150MG

中文名：律諾膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

心室性心搏過速，上心室性心搏過速，W-P-W症候群。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
由於 propafenone 具有苦味及表面麻醉的作用，因此，此膜衣錠須於飯後合著些許液體整顆吞服(勿咀嚼)。

成人

體重70公斤左右的患者，建議的propafenone hydrochloride 初劑量和維持劑量是每天450-600mg，分二至三次服用。有時候，propafenone的劑量可能需要增加到每天900 mg。

兒童

在劑量調整和維持治療時期，孩童之建議劑量為平均每天10-20 mg/kg，分成3-4次單一劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

視力模擬、眩暈、疲勞與姿態性低血壓可能會影響到患者的反應速度而減弱個人開車或操作機械的能力。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭暈、心臟傳導異常和心悸。

六、此藥儲存時的條件為何？

請於25° C 以下儲存並置於小孩不及之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06