用藥指導單張

衛教小組 DA1500101

學　名：Amlodipine

商品名：norvASC (Amlodipine) 5MG

中文名：脈優錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓、心絞痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
高血壓和心絞痛，通常起始劑量為5公絲，一天一次，可依病人症狀增加劑量最高至10公絲。若和thiazide類利尿劑，β-阻斷劑及ACE抑制劑併用時，不需調整劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品過量引起臨床上明顯的低血壓，須要給予主動的心臟血管支持性治療，包括監測心臟和呼吸功能，抬高四肢，注意循環液體積和尿量。
2. 雖然老年人比年輕人有較高的血漿濃度，但二者之排泄半衰期相近，以類似劑量使用於老年人或年輕人，耐受性相似，因此一般劑量可推薦使用。
3. 本品大部份被代謝成非活性的代謝物，只有10%，以原型由尿液排泄，本品血漿濃度的改變和腎臟的損傷程度無關，所以在此類病人可給予正常的劑量。本品不可透析。
4. 孕婦及授乳之使用本品宜小心。
5. 本品可能造成頭暈、目眩，病人在站立或走路時應小心扶持。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本品的耐受性極佳，在臨床試驗中發現最常見之副作用為頭痛、水腫、疲倦、噁心、臉部潮紅和暈眩，由本品引起之實驗室檢查的異常極少發現。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DA1500101

學　名：Amlodipine

商品名：norvASC (Amlodipine) 5MG

中文名：脈優錠



六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存於25度C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20