# 用藥指導單張

衛教小組 DE12010101

學　名：Canagliflozin

商品名：CANAGLU 100MG

中文名：可拿糖膜衣錠




## 一、此藥品的用途是什麼？

1. 第二型糖尿病。
2. 糖尿病腎病變（巨量蛋白尿期）。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人每日一次，於早餐前或早餐後口服 Canagliflozin 100mg。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 使用本藥品時，必須向病人詳細說明低血糖的症狀及處理方式。尤其是與胰島素製劑、硫醯基尿素類(Sulfonylurea)或速效型促胰島素分泌藥物併用時，可能會增加低血糖的風險。
2. 本藥品的利尿作用可能導致多尿或頻尿的情形。因體液量可能減少，應指導病人適當地補充水分並小心觀察病人情形。
3. 使用本藥品治療期間應定期檢測血糖，並確認藥品的療效，如以本藥品治療3個月後療效仍不足，應考慮改為其他治療方法。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

無症狀低血糖、低血糖、頻尿、血中酮體增加、便秘等。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

保存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09