用藥指導單張

衛教小組 DA0600101

學　名：Pitavastatin

商品名：LIVALO 2MG

中文名：力清之膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

對需要調節血脂狀態的患者，藥物治療應為多重風險因子療法的其中一個要素。僅在以飲食控制飽和脂肪及膽固醇的攝取和其他非藥物方式仍不足時，方能輔以血脂調節藥物。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人：每日1次，於晚餐後口服1~2mg。劑量可依年齡、症狀作適當增減，LDL-低密度膽固醇值(LDL-C)降幅不足時可調升劑量，每日最高服用劑量為 4mg。輕、中度腎功能不全(腎絲球濾過率30 至< 80 mL/min/1.73 m2)及正接受血液透析的末期腎臟病：起始劑量為每日一次1mg，最高劑量為每日一次 2mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對骨骼肌的影響(如肌肉病變及橫紋肌溶解症)：風險增加程度具劑量依存性，並與高齡(>65歲)、腎功能不全、甲狀腺機能低下治療不足及合併使用fibrate類藥物相關。患者應立即告知醫師不明原因的肌肉疼痛、觸痛、虛弱無力情形，若病徵或症狀出現則停用LIVALO。

2. 肝臟酵素異常現象及監測：可能會有不明原因的肝轉胺酶持續上升現象。在治療前及治療中監測肝臟酵素。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常出現的不良反應為肌肉疼痛、背痛、腹瀉、便秘及四肢疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

保存於25℃，開封後請勿放置於潮濕處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02