用藥指導單張

衛教小組 DA4080201

學　名：Mexiletine

商品名：MELETIN 100MG

中文名：脈律循膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

心室性不整律。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

初服劑量：如果即需達最高血中濃度，初服劑量為400mg。

持續劑量：依臨床反應而定，第一次持續劑量在初服劑量後2-6小時間服用，每日400-800mg分次給與。

三、使用時我該注意的特別事項？

竇房結官能障者，傳導障害，心跳過慢，低血壓或心臟、腎臟或肝臟衰竭可能需要降低劑量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

消化不良、噁心、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃ 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06