用藥指導單張

衛教小組 DB16240101

學　名：Allopurinol

商品名：ALLOPURINOL 100MG

中文名：安樂普諾



一、此藥品的用途是什麼？

痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

抗痛風:初始劑量--口服，100mg，一天一次。維持劑量--口服，100至200mg，一天二至三次，或300mg單一劑量，一天一次。在輕度痛風者的一般維持劑量為每天200mg至300mg。

一般孩童劑量:年齡及於6歲的孩童:口服，50mg，一天三次。

年齡6至12歲的孩童:口服，100mg，一天三次；或300mg當作一個單一劑量，一天一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.每天至少要飲用2000ml的液體，而且要鹼化尿液，防止尿酸的沉積和可能造成的腎損壞。

2.要告訴病人allopurinol的效力可能要花好幾個星期才會產生，並且警告病人，除非醫師有指示，否則不要改變劑量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

過敏性皮膚炎，最常發生斑丘狀皮疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11