用藥指導單張

衛教小組 DQ1540101

學　名：Pilocarpine

商品名：SALAGEN 5MG

中文名：舒樂津錠劑



一、此藥品的用途是什麼？

因頭頸部癌放射線治療造成唾腺功能減低而引起的口乾燥症。

SJOGREN'S SYNDROME 所引起的口乾燥症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

頭頸癌病患：Salagen tablets的建議起始劑量為5mg，一天三次。劑量可依治療反應及忍受度做調整。一般劑量為每日3~6錠或15~30mg (每次劑量不可超過2錠)。雖然服用初期即有進步，但在治療上服滿12周更有益 常見的副作用發生率會隨著劑量增高而增大。應以能忍受及有效的最低劑量做為維持劑量。

Sjogren's Syndrome病患：Salagen tablets的建議劑量為一次一錠5mg，一天四次。 至多6周後即可建立明確之效果。

三、使用時我該注意的特別事項？

支氣管氣喘病的患者使用宜小心，特別是做全身性使用時，因為本品會造成支氣管收縮作用。

勸告病人若有發汗、流涎、強直和噁心的症狀立刻要報告，因為這是全身性中毒發作的徵兆。

本品要避光，因為它很不穩定。

勿將滴管與眼瞼接觸，以免發生污染的情形。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

睫狀肌痙攣，頭痛，難以集中視力，暗處視力降低，局部刺激作用，唾液分泌，增加水汗。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18

用藥指導單張

衛教小組 DQ1540101

學　名：Pilocarpine

商品名：SALAGEN 5MG

中文名：舒樂津錠劑



藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18