
用藥指導單張

衛教小組 DA14790101

學　名：Amlodipine+Olmesartan medoxomil

商品名：SEVIKAR 5/40MG(紫)(高劑量)

中文名：舒脈康膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.一般考慮事項

Olmesartan medoxomil通常很少產生副作用，且副作用顯然與劑量無關，但amlodipine的副作用（主要是水腫）則與劑量有關。改變劑量後2週內可達到最大降血壓效果。 Sevikar 可搭配或不搭配食物服用。 Sevikar可與其他降血壓藥物併用。使用2週後可增加劑量。Sevikar的最高建議劑量是10/40mg。

2.替代治療

Sevikar可以取代其個別的成份。取代個別成份時，若血壓控制仍不理想，可提高其中一種或兩種成份的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.胎兒毒性

對懷孕女性投予Sevikar可能會對胎兒造成傷害。在懷孕第2和第3期時，使用腎素-血管昇壓素系統的藥物會使胎兒腎功能降低及增加胎兒和新生兒罹病率與死亡。藥物造成的羊水過少則與胎兒肺部發育不良及胎兒四肢攣縮有關。潛在的新生兒副作用包括顱骨發育不全、無尿症、低血壓、腎臟衰竭及死亡。

一旦病人確定懷孕，需立即讓病人停用Sevikar。

2.體液不足或鹽分不足病人發生低血壓

Olmesartan medoxomil：腎素-血管收縮素系統已活化的病人，例如體液不足及／或鹽分不足型病人（例如接受高劑量利尿劑治療者），開始接受olmesartan medoxomil治療後，可能發生有症狀的低血壓。這些病人應在密切醫療監督下開始接受Sevikar治療，若發生低血壓，應保持仰臥姿勢，必要時以靜脈輸液給予生理食鹽水。暫時性低血壓反應並非繼續治療的禁忌症，通常於血壓穩定後即可繼續治療。

Amlodipine：可能會發生症狀性低血壓，尤其是重度主動脈瓣狹窄的病人。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03


用藥指導單張

衛教小組 DA14790101

學　名：Amlodipine+Olmesartan medoxomil

商品名：SEVIKAR 5/40MG(紫)(高劑量)

中文名：舒脈康膜衣錠



由於症狀是逐漸出現，因此極少發生急性低血壓。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

水腫、頭暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃ 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03